




مرکز آموزشی درمانی قلب شهید دکتر چمران

داروهای قلبی عروقی

داروهای ضد پلاکتی

کلویدوگروول (پلاویکس-اسویکس)



تهیه کننده: زهرا رضائی

سوپروایزر آموزش سلامت

نایید کننده:

متخصصین داخلی قلب

کد پمفلت: D/02/00

منابع :

۱- مروری بر اطلاعات دارویی داروهای قلبی و عروقی
تالیف دکتر علیرضا علی آبادی (۱۳۹۱)

۲- داروهای ژنریک ایران، تالیف مرجان رسولی (۱۳۹۱)

۳- TEXTBOOK OF CARDIOLOGY BRAUNWALD - 2013.

شماره تماس در صورت داشتن هرگونه سؤال :

(داخلی ۲۹۵) - ۲۶۰۰۹۶۱۴ (۰۳۱۱)

www.chamran.mui.ac.ir

نکته مهم:

برای بیمارانی که تحت عمل بالن (آنژیوپلاستی) قرار میگیرند مصرف روزانه این دارو از ۷ روز قبل از عمل شروع می شود و ادامه آن بعد از عمل با توجه به نظر پزشک ممکن است تا چند سال ادامه یابد لذا

از قطع خود سرانه این دارو جدا اجتناب کنید،

زیرا عدم مصرف این دارو می تواند با تولید لخته در عروق قلب سبب مرگ ناگهانی گردد.

در موارد زیر فوراً به پزشک خود مراجعه کنید.

*هرگاه با خونریزی در یکی از اعضاء خود مانند معده و روده روبرو شدید.

*مشاهده مدفوع خونی یا سیاه رنگ.

*استفراغ خونی یا سرفه هایی به همراه دفع خون

نکته:

مصرف (پلاویکس-اسویکس) ۹ در مادران باردار و شیرده با احتیاط و با نظر پزشک مربوطه می باشد.



پلاویکس - اسویکس + (کلوپیدوگرل) چیست؟

یکی از داروهای ضد تجمع پلاکتی است که ثابت شده خطر بروز مجدد سگته مغزی و یا حمله قلبی را کاهش می دهد.

پلاکت چیست؟

پلاکت از سلول های درون خون است که در جلوگیری از خونریزی بخصوص در مراحل اوایل نقش اساسی دارد و در سگته های قلبی یا مغزی با استفاده از استنت باید با مصرف دارو کارایی آنها را کاهش داد.

معنی داروی ضد پلاکتی چیست؟

داروهای ضد پلاکتی مانند پلاویکس یا اسویکس (نوع ایرانی) برای جلوگیری از تشکیل لخته در عروق مصرف می شوند تا خون به راحتی در عروق جریان یافته و اکسیژن به ارگان های حیاتی بدن مانند مغز و قلب برسد.

موارد مصرف این دارو چیست؟

این دارو جهت پیشگیری از لخته بعد از سگته قلبی، سگته مغزی همچنین پس از اعمال استنت گذاری عروق قلب، توسط پزشکان تجویز می شود.

راه مصرف این دارو چگونه است؟

(پلاویکس - اسویکس) به صورت قرصهای ۷۵ میلی گرم وجود دارد که به طور خوراکی مصرف می شود. معمولاً یک بار در روز همراه با غذا به تنهایی و در زمان مشخص داده می شود. مقدار و زمان مصرف این

قرص طبق تجویز پزشک معالج فرد تعیین می شود. مشورت با پزشک معالج با توجه به اهمیت این قرص بسیار ضروری است. نیمه عمر این دارو ۸ ساعت است و از طریق کلیه ها و روده دفع می شود.

عوارض جانبی این دارو چیست؟

مصرف (پلاویکس - اسویکس) می تواند باعث ایجاد راش پوستی، خارش، اسهال، التهاب معده، خونریزی از بینی، سرگیجه، ضعف سر درد شود ولی مهمترین عارضه جانبی خونریزی است، که البته بسیار نادر می باشد.

چه مواردی باید هنگام مصرف این دارو رعایت می شود؟

- از آنجا که این دارو مانع ایجاد لخته خونی می شود می تواند باعث تشدید خونریزی گردد، بنابراین باید حتی المقدور خود را از وقوع هرگونه ضربه محافظت نمایید.

- بیمارانی که این دارو را مصرف می کنند باید از نوشیدن الکل جدا خودداری نمایند زیرا الکل می تواند میزان خونریزی از معده و روده را افزایش دهد.

- قبل از انجام هرگونه اقدامات اصلاحی با دندانپزشکی موضوع مصرف این قرص را حتماً به اطلاع پزشک مربوطه برسانید، زیرا در مواردی لازم است که شما حداقل ۵ روز قبل از انجام اعمال مذکور از مصرف (پلاویکس - اسویکس) خودداری نمائید تا مانع از خطر افزایش خونریزی غیرقابل کنترل گردد.

- هرگز در زمانی که تحت درمان با این دارو هستید بدون مشورت پزشکان از داروهای مسکن ضد التهاب غیر استروئیدی (مانند ایبوپروفن، دیکلوفناک، مفنامیک اسید) و همچنین فنی توئین و... استفاده نکنید.

- در بیمارانی که به (پلاویکس - اسویکس) آلرژی و حساسیت دارند یا مبتلا به خونریزی مغزی هستند، این دارو می تواند بسیار خطرناک باشد لذا جهت مصرف آن باید با پزشک خود فوراً مشورت نمایند.
- هرگونه حساسیت دارویی را قبل از مصرف دارو، به اطلاع پزشک برسانید.

*همچنین موارد زیر را نیز به اطلاع پزشک برسانید.

۱- ابتلا به بیماری کلیوی

۲- وجود هرگونه اختلال انعقاد خونی مانند بیماری هموفیلی و اختلالات پلاکتی

۳- سابقه مصرف وارفارین ۴- سابقه سگته مغزی و TIA (سگته خفیف مغزی) ۵- ابتلا به زخم معده یا بیماری کولیت السراتیو

۶- ابتلا به بیماری کبدی

* جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را بعد از غذا میل کنید. بیمارانی که از ازدیاد ترشح اسید معده رنج می برند می توانند با نظر پزشک معالج از داروهایی مثل فاموتیدین یا سایمتدین و... نیز با پزشک معالج خود مشورت نمایند.