



مرکز آموزشی درمانی قلب شهید دکتر چمران

داروهای قلبی عروقی  
ریواروکسابان

Rivaroxaban

تهیه کننده: اعظم دبیری

تایید کنند: ه

دکتر محمد کرمانی القریشی

متخصص قلب و عروق

بهار ۱۴۰۰

کد پمفلت: ۰۵/۰۰ / D

توصیه برای بیماران:

اگر هریک از علائم زیر را پیدا کردید به پزشک خود اطلاع دهید.

- خونریزی از بینی
- خونریزی غیر معمول از لثه
- ادرار قرمز یا صورتی یا قهوه ای
- مدفوع قرمز روشن یا سیاه
- استفراغ خونی یا دانه های قهوه ای
- سر درد یا احساس ضعف یا سبکی سر
- درد یا تورم یا ترشحات جدید از زخم ها

منبع:

- TEXTBOOK OF CARDIOLOGY BRAUN-WALD-2018.
- Med Scape site
- سایت دارویاب
- تحقیقات و مقالات اینترنتی

شماره تماس در صورت داشتن هرگونه سؤال:

(۲۹۵) ۴-۳۲۶۰۰۹۶۱ (۰۳۱)

www.chamran.mui.ac.ir

عوارض جانبی ریواروکسابان:  
\* افزایش خطر خونریزی



نکات مهم:

- برای بررسی اثر دارو نیاز به انجام هیچ گونه آزمایشی نمی باشد.
- چک PT/ INR در مصرف این دارو نیاز نیست. و در صورت افزایش عدد این آزمایش، این اعداد قابل استناد نمی باشد. پس چک آزمایش PT/ INR در مصرف این دارو اصلا توصیه نمی شود.

۹- ریواروکسaban در بیماران با دریچه مصنوعی نباید مصرف شود.

۱۰- برای بررسی اثر دارو نیاز به انجام هیچ گونه آزمایشی نمی باشد.

۱۱- در صورت مصرف داروهایی از قبیل آمیودارون، دیلتیازم، آزیترومایسین، اریترومایسین، کلاریترومایسین حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

۱۲- دوز دارو را به هیچ عنوان تغییر ندهید و مصرف دارو را بدون نظر پزشک معالج قطع نکنید.

۱۳- قرص ریواروکسaban نیاز به نگهداری در یخچال ندارد و در دمای ۲۵-۲۰ درجه نگهداری می شود.

### مصرف ریواروکسaban در بارداری:

ریواروکسaban زمانی باید تجویز شود که منافع آن در برابر خطرات بالقوه مادر و جنین سنجیده شود ولی در حال حاضر مصرف آن در بارداری ممنوع است.



### نکاتی که باید در رابطه با ریواروکسaban بدانیم:

۱- در صورت قطع ناگهانی دارو خطر ایجاد لخته افزایش می یابد.

۲- در بیماران با نارسایی کلیه مصرف دارو حتما زیر نظر پزشک معالج باشد.

۳- در صورت عدم توانایی بلع، مخلوط کردن قرص مانعی ندارد و با آب سیب مخلوط شود و اثر دارو تا ۴ ساعت پایدار است.

۴- خطر خونریزی جدی دارد و در کسانی که خطر خونریزی زیاد است تصمیم گیری برای استفاده دارو به عهده پزشک معالج و بیمار می باشد.

۵- نیمه عمر و مدت اثر ریواروکسaban ۹-۵ ساعت است و با مخلوط شدن با آب سیب تا ۴ ساعت کاهش می یابد.

۶- مصرف داروهای مثل آسپرین، پلاویکس، کتوکنازول و دیتوناویو و کاربامازپین و فنی توئین و داروهایی از این دسته خطر خونریزی را افزایش می دهند.

۷- در صورت نیاز به اعمال جراحی و عدم اختلال عملکرد کلیه دارو باید از ۲۴ ساعت قبل قطع و بعد از جراحی باید بلافاصله دارو با نظر پزشک معالج شروع شود.

۸- مصرف دارو در بیماران با مشکلات کبدی با نظر پزشک معالج انجام می شود.

### ریواروکسaban

ریواروکسaban یک داروی ضد انعقاد خون است که با مهار فاکتور ۱۰ انعقادی عمل می کند.



### موارد مصرف:

پیشگیری از لخته و آمبولی در بیماران با فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و درمان ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه و پیشگیری از حوادث ترومبوتیک در بیماران تحت اعمال ارتوپدی مثل تعویض مفصل زانو می باشد.

### راه مصرف ریواروکسaban:

ریواروکسaban شکل قرص های ۲/۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ میلی گرمی می باشد که در از راه دهان و به صورت خوراکی استفاده می شود که قرص های ۱۵ و ۲۰ میلی گرمی باید با غذا و در ساعات ظهر یا عصر و شکل ۱۰ میلی گرمی با یا بدون غذا مصرف می شود.

### موارد منع مصرف:

۱- خونریزی

۲- حساسیت به ریواروکسaban