

## داروی آمیودارون چیست ؟

آمیودارون به عنوان داروی ضد آریتمی شناخته می شود. آمیودارون در درمان انواع خاصی از ضربان های نامنظم قلب (مانند فیبریلاسیون مداوم بطنی) استفاده می شود. همچنین برای بازگرداندن ریتم طبیعی قلب و حفظ ضربان قلب منظم و ثابت استفاده می شود (یعنی هم در درمان آریتمی و هم نگهداشتن ریتم سینوسی استفاده می شود). آمیودارون همچنین به عنوان محلول تزریقی داخل وریدی وجود دارد که فقط توسط ارائه دهنده خدمات بهداشتی در بیمارستان تجویز می شود. آمیودارون ممکن است به عنوان بخشی از درمان ترکیبی استفاده شود. این بدان معناست که شما باید آن را با داروهای دیگر مصرف کنید.

## اشکال دارویی :

۱) قرص ۲۰۰ میلی گرم

۲) آمپول ۱۵۰ میلی گرم/۳ میلی لیتر



## طریقه جذب دارو :

جذب آمیودارون از راه خوراکی و متغیر است. حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از راه خوراکی جذب می شود. سرعت دستیابی به غلظت پلاسمایی یکنواخت و درمانی دارو، کند و دفع دارو طولانی است. متابولیسم این دارو کبدی است. اثر دارو ۲ تا ۳ روز تا ۲ تا ۳ ماه پس از مصرف شروع می شود و حداکثر غلظت پلاسمایی نیز ۳ تا ۷ ساعت پس از مصرف حاصل می شود.

## موارد منع مصرف: اختلال شدید در

عملکرد گره سینوسی- بلوک درجه دو و سه دهلیزی بطنی- کاهش ضربان قلب همراه با سنکوپ- دوران بارداری و شیردهی- حساسیت دارویی

## موارد احتیاط :

اختلالات تیروئید-بیماری شدید کبدی یا ریوی- کودکان- کاهش پتاسیم خون-بیمارانی که داروی آنتی آریتمی، بتا بلوکر مانند (ایندرال-متورال) و کلسیم بلوکر مانند (وراپامیل و دیلتیازیم) مصرف می کنند.

## عوارض جانبی آمیودارون :

- ضعف، خستگی، سردرد و سرگیجه
- کاهش ضربان قلب و نارسایی قلبی
- اختلال در دید، خشکی چشم، کدورت لنز
- حساسیت به نور، بثورات جلدی
- هیپو و هیپر تیروئیدی
- تهوع استفراغ و آسیب کبدی و تغییر نتایج آنزیم های کبدی
- اختلال الکترولیتی و کاهش پلاکت خون

# مرکز آموزشی درمانی قلب شهید دکتر چمران

## داروهای قلبی عروقی آمیودارون



تهیه کننده: مطهره علیرضایی

کارشناس پرستاری

تایید کننده: جناب آقای دکتر ازهری

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

کد پمفلت: ۰۶/۰۰/D

۹) شروع اثر دارو طولانی است و بهبود علائم ممکن است چند هفته طول بکشد.

۱۰) به علت شروع اثر دارو، مشکل بودن تنظیم

مقدار مصرف و احتمال بروز عوارض جانبی

شدید، این دارو در بیمارستان شروع شده و مقدار

مصرف دارو برای هر بیمار باید جداگانه و

براساس نیازهای بیمار صورت پذیرد و از تغییر

میزان مصرف دارو خودداری شود.

۱۰) در صورت بروز تنگی نفس یا پیشرفت آن و

همچنین بروز سرفه به پزشک مراجعه شود.

منابع: ۱) راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک

ایران. تألیف: دکتر رامین خدام.

۲) سایت دارویاب.

3) TEXTBOOK OF CARDIOLOGY  
BRAUNWALD -

۲۰۱۸

شماره تماس در صورت داشتن هرگونه سؤال:

(داخلی ۲۹۵) ۴-۰۹۶۱۰۰۹۶۱-۳۲۶۰۰۳۱

www.chamran.mui.ac.ir

## آموزش به بیمار و خانواده:

۱) این دارو را دقیقاً مطابق با دوز تجویز شده استفاده کنید.

۲) به منظور جلوگیری از سوختگی، از کرم ضد آفتاب استفاده نموده و همواره دور از آفتاب باشید.

۳) عوارض جانبی را سریعاً گزارش کنید.

۴) تغییر رنگ پوست اغلب برگشت پذیر است.

۵) جهت پیشگیری از حساسیت به نور میتوان از عینک آفتابی استفاده نمود.

۶) معاینه چشم و دستگاه تنفس طی دوره درمان الزامی است.

۷) آزمون عملکرد کبد و تیروئید در درمان

طولانی مدت ضروری است. آمیودارون می تواند سبب بروز اختلال در عملکرد تیروئید شود.

۸) در صورت نارسایی قلب، عیب کار کلیه،

کاهش شدید ضربان قلب، دارو با نظر پزشک معالج تنظیم شود.